

MGI Michiana Gastroenterology Inc.

Teléfono: (574) 234-0049 Fax: (574) 234-0053

www.michianagastro.com

Instrucciones para colonoscopia/Sig. flex. con SuFlave

****Tenga en cuenta que pueden existir varios cargos separados para este procedimiento. Un cargo para la instalación y otro para el médico. Pueden existir posibles cargos por anestesia y**

Paciente: _____ Dr. _____

Fecha: ____/____/____ Hora de llegada: _____ am/pm Hora del procedimiento: _____ am/pm

____ Michiana Endoscopy Center
53830 Generations Drive
South Bend, IN 46635

____ Plymouth-SJRM
Regístrese en Surgery Ctr.
Building 5

____ SB Clinic SurgiCenter
211 N. Eddy Street
South Bend, IN 46617

____ Mishawaka - SJRM
Entrada principal
Admisión de pacientes

____ Memorial Hospital
Entrada principal
Admisión de pacientes

* IMPORTANTE*LEA ESTO AHORA* Anticoagulantes:

Si está tomando un anticoagulante, consulte con el médico que se lo recetó para garantizar que sea seguro suspenderlo durante los siguientes períodos de tiempo. También le enviaremos una carta al médico para informarle de su próxima cita.

Suspender 7 días antes del procedimiento, Suspender 5 días antes del procedimiento, Suspender 2 días antes del procedimiento

Aggrenox (Aspirina/Dipiridamol)
Brilinta (Ticagrelor)
Effient (Prasugrel)
Plavix (Clopidogrel)
Pletal (Cilostazol)

Coumadin (Warfarina)

Eliquis (Apixaban)
Pradaxa (Dabigatran)
Savaysa (Edoxaban)
Xarelto (Rivaroxaban)

Haga estas cosas 7 días antes del procedimiento:

- Deje de tomar medicamentos y suplementos de hierro. Puede continuar tomando complejos vitamínicos.
- Organice para que alguien lo lleve de vuelta a su casa. Se le administrarán medicamentos para mantenerlo relajado durante el procedimiento, de modo que no puede conducir para irse a su casa ni tomar un taxi solo.
- Si se inyecta insulina, llame al médico que se la recetó para realizar cualquier ajuste necesario el día en que debe beber la preparación y el día del procedimiento. No queremos que su nivel de azúcar en sangre sea demasiado bajo.

Haga estas cosas 1 día antes del procedimiento (Día en que debe beber la preparación):

- NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO HOY**
- Solo puede tomar líquidos claros durante todo el día y la noche. NO DEBEN SER DE COLOR ROJO NI MORADO.** Los líquidos claros incluyen: té o café (**sin leche ni crema**), caldo, jugo de manzana, jugo de arándano blanco, 7 up, ginger ale y agua. También puede ingerir Gatorade, paletas heladas y gelatina, pero recuerde que no deben ser de color rojo ni morado.
- No beba alcohol.**
- Comience a beber su preparación de acuerdo con las instrucciones de su médico, que se encuentran en la parte posterior de esta página.
- Siga bebiendo líquidos claros todo el día. Esto ayudará a que la preparación logre un mejor resultado.
- La preparación que deberá tomar lo hará ir al baño muchas veces. Esto es necesario para que su colon quede limpio para el procedimiento.

Haga estas cosas el día del procedimiento:

- NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO**
- NO tome su(s) pastilla (s) para la diabetes. Si suele controlar su nivel de azúcar en sangre, hágalo esta mañana.
- Puede tomar sus otras pastillas matutinas habituales al menos 3 horas antes de la hora del procedimiento.
- Puede seguir tomando líquidos claros, pero **deje de beber 3 horas antes del procedimiento.**
- Concurra al Centro de Endoscopia con la persona que lo llevará de vuelta a su casa.
- El tiempo de permanencia en el lugar es de aproximadamente 2 ½ horas.
- Lleve la tarjeta del seguro, una identificación con foto y todos los medicamentos a su cita.

REVERSO →

Día previo al procedimiento
Siga las instrucciones que figuran en esta hoja, no en el empaque de la preparación para el colon

1. **No coma ningún alimento sólido hoy.** Es importante beber al menos ocho (8) vasos de líquidos claros a lo largo del día. Líquidos claros: jugo de manzana, jugo de arándano blanco, jugo de uva blanca, 7 up, ginger ale, Gatorade o agua. Asegúrese de no beber nada que sea rojo o morado.
2. Abra 1 paquete potenciador de sabor y vierta el contenido en 1 botella. Llene la botella provista con agua tibia hasta la línea de llenado. Después de tapar el frasco, agítelo suavemente hasta que todo el polvo se haya mezclado bien (disuelto). Para obtener el mejor sabor, refrigere la solución durante una hora antes de beberla. No congelar. Usar dentro de las 24 horas. Algunas personas dicen que tomar sorbos de caldo o chupar una lima ayudará a mejorar el sabor.
3. A las 6:00 pm, beba 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta vaciar la botella. Beba toda la solución.
4. Durante la siguiente hora, beba 16 onzas adicionales de cualquiera de los líquidos claros aprobados.
5. La preparación podría hacer efecto en 20 minutos, así que quédese cerca del baño. Puede usar vaselina, cualquier crema para la dermatitis del pañal o toallitas húmedas para bebés, etc. en el trasero. Esto ayudará a que no le duela tanto.

Día del procedimiento

1. Si se despierta con heces sólidas, llame al centro en el que está programado. Los números de teléfono se enumeran a continuación.
2. **NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO hasta después de su procedimiento**
3. Repita las instrucciones de mezcla que se enumeran en el día antes al procedimiento (parte superior de la página), paso 2.
4. A las _____ am, beba 8 onzas de solución cada 15 minutos hasta que la botella esté vacía. Beba toda la solución.
5. Durante la siguiente hora, beba 16 onzas adicionales de cualquiera de los líquidos claros aprobados. Se recomienda beber líquidos claros para prevenir la deshidratación.
6. **¡¡NO BEBA NI TOME MEDICAMENTOS DURANTE LAS 3 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO!!**

Números de teléfono en caso de tener preguntas:

Michiana Gastroenterology, Inc.
Horario de atención

(574) 234-0049 o 1-877-818-7084 (línea gratuita)

Lunes, martes y jueves de 8:00am a 4:30pm

Miércoles y viernes de 8:00am a 1:30pm

Michiana Endoscopy Center
Horario de atención

(574) 271-0893 o 1-866-669-8743 (línea gratuita)

Lunes a jueves de 5:45am a 5:00 pm

Viernes de 5:45am a 4:00pm

St. Joseph Regional Medical Center
Memorial Hospital
Plymouth Hospital
South Bend Clinic SurgiCenter

(574) 335-5000

8am a 4pm

(574) 647-6700

8am a 4pm

(574) 948-4000

(574) 204-6393

Si necesita cancelar, reprogramar o tiene preguntas sobre la preparación, llame al consultorio al 574-234-0049.

EN CASO DE EMERGENCIA, ¡CONCURRA A LA SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL!