

MGI Michiana Gastroenterology Inc.

Teléfono: (574) 234-0049 Fax: (574) 234-0053

www.michianagastro.com

Instrucciones para colonoscopia/Sig. flex. con Sutab

****Tenga en cuenta que pueden existir varios cargos separados para este procedimiento. Un cargo para la instalación y otro para el médico. Pueden existir posibles cargos por anestesia y patología.****

Paciente: _____ Dr. _____

Fecha: ____/____/____ Hora de llegada: _____ am/pm Hora del procedimiento: _____ am/pm

____ Michiana Endoscopy Center
53830 Generations Drive
South Bend, IN 46635

____ Plymouth-SJRM
Regístrese en Surgery Ctr.
Building 5

____ Memorial Hospital
Entrada principal
Admisión de pacientes

____ Mishawaka - SJRM
Entrada principal
Admisión de pacientes

____ SB Clinic SurgiCenter
211 N. Eddy Street
South Bend, IN 46617

____ LaPorte Surgical Center
900 I Street
LaPorte, IN 46350

* IMPORTANTE*LEA ESTO AHORA* Anticoagulantes:

Si está tomando un anticoagulante, consulte con el médico que se lo recetó para garantizar que sea seguro suspenderlo durante los siguientes períodos de tiempo. También le enviaremos una carta al médico para informarle de su próxima cita.

Suspender 7 días antes del procedimiento, Suspender 5 días antes del procedimiento, Suspender 2 días antes del procedimiento

Aggrenox (Aspirina/Dipiridamol)
Brilinta (Ticagrelor)
Effient (Prasugrel)
Plavix (Clopidogrel)
Pletal (Cilostazol)

Coumadin (Warfarina)

Eliquis (Apixaban)
Pradaxa (Dabigatran)
Savaysa (Edoxaban)
Xarelto (Rivaroxaban)

Haga estas cosas 7 días antes del procedimiento:

- Deje de tomar medicamentos y suplementos de hierro. Puede continuar tomando complejos vitamínicos.
- Organice para que alguien lo lleve de vuelta a su casa. Se le administrarán medicamentos para mantenerlo relajado durante el procedimiento, de modo que no puede conducir para irse a su casa ni tomar un taxi solo.
- Si se inyecta insulina, llame al médico que se la recetó para realizar cualquier ajuste necesario el día en que debe beber la preparación y el día del procedimiento. No queremos que su nivel de azúcar en sangre sea demasiado bajo.

Haga estas cosas 1 día antes del procedimiento (Día en que debe beber la preparación):

- NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO HOY**
- Solo puede tomar líquidos claros durante todo el día y la noche. NO DEBEN SER DE COLOR ROJO NI MORADO.** Los líquidos claros incluyen: té o café (**sin leche ni crema**), caldo, jugo de manzana, jugo de arándano blanco, 7 up, ginger ale y agua. También puede ingerir Gatorade, paletas heladas y gelatina, pero recuerde que no deben ser de color rojo ni morado.
- No beba alcohol.**
- Comience a beber su preparación de acuerdo con las instrucciones de su médico, que se encuentran en la parte posterior de esta página.
- Siga bebiendo líquidos claros todo el día. Esto ayudará a que la preparación logre un mejor resultado.
- La preparación que deberá tomar lo hará ir al baño muchas veces. Esto es necesario para que su colon quede limpio para el procedimiento.

Haga estas cosas el día del procedimiento:

- NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO**
- NO tome su(s) pastilla (s) para la diabetes. Si suele controlar su nivel de azúcar en sangre, hágalo esta mañana.
- Puede tomar sus otras pastillas matutinas habituales al menos 3 horas antes de la hora del procedimiento.
- Puede seguir tomando líquidos claros, pero **deje de beber 3 horas antes del procedimiento.**
- Concurra al Centro de Endoscopia con la persona que lo llevará de vuelta a su casa.
- El tiempo de permanencia en el lugar es de aproximadamente 2 ½ horas.
- Lleve la tarjeta del seguro, una identificación con foto y todos los medicamentos a su cita.

REVERSO →

Día previo al procedimiento

Siga las instrucciones que figuran en esta hoja, no en el empaque de la preparación para el colon

1. **No coma ningún alimento sólido hoy.** Es importante beber al menos ocho (8) vasos de líquidos claros durante el día.
2. A las 6:00 pm, abra un (1) frasco de doce (12) comprimidos. Llene el recipiente de 16 onzas que se proporciona con uno de los siguientes líquidos claros: jugo de manzana, 7 up, ginger ale, Gatorade (no deben ser de color rojo ni morado) o agua. Tome 1 tableta cada 4 minutos con un sorbo de líquido hasta terminar las doce (12) tabletas. Esto debería llevarle aproximadamente 48 minutos.
3. Durante la siguiente hora, beba dos (2) recipientes más del recipiente provisto lleno de cualquiera de los líquidos claros aprobados.
4. Las pastillas son un laxante y pueden hacer efecto en 20 minutos (cada persona es diferente), por lo que debe permanecer cerca del baño. Puede usar vaselina, cualquier crema para la dermatitis del pañal o toallitas húmedas para bebés, etc. en las nalgas. Esto ayudará a que no se produzca irritación.

Día del procedimiento

1. Si al despertar tiene deposiciones sólidas, llame al centro que se le programó. Los números de teléfono se enumeran a continuación.
2. **NO COMA NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO hasta después del procedimiento.**
3. A las _____ am, abra el último frasco de doce (12) comprimidos. Llene el recipiente de 16 onzas que se proporciona con uno de los siguientes líquidos claros: jugo de manzana, 7 up, ginger ale, Gatorade (no deben ser de color rojo ni morado) o agua. Tome 1 tableta cada 4 minutos con un sorbo de líquido hasta terminar las doce (12) tabletas. Esto debería llevarle aproximadamente 48 minutos.
4. Durante la siguiente hora, beba dos (2) recipientes más del recipiente provisto lleno de cualquiera de los líquidos claros aprobados.
5. **¡¡NO BEBA NI TOME MEDICAMENTOS 3 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO!!**

Números de teléfono en caso de tener preguntas:

Michiana Gastroenterology, Inc.

Horario de atención

(574) 234-0049 o 1-877-818-7084 (línea gratuita)

Lunes, martes y jueves de 8:00am a 4:30pm

Miércoles y viernes de 8:00am a 1:30pm

Michiana Endoscopy Center

Horario de atención

(574) 271-0893 o 1-866-669-8743 (línea gratuita)

Lunes a jueves de 5:45am a 5:00 pm

Viernes de 5:45am a 4:00pm

St. Joseph Regional Medical Center

(574) 335-5000

8am a 4pm

Memorial Hospital

(574) 647-6700

8am a 4pm

LaPorte Surgical Center

(219) 324-1670

Plymouth Hospital

(574) 948-4000

South Bend Clinic SurgiCenter

(574) 204-6393

Si necesita cancelar, reprogramar o tiene preguntas sobre la preparación, llame al consultorio al 574-234-0049.

EN CASO DE EMERGENCIA, ¡CONCURRA A LA SALA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL!